



ПЕРОРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ



На 100 мл готової суміші	Nutridrink Protein	Nutridrink Compact Fibre	Nutridrink Powder	Nutridrink Skin Repair	Diasip низький ГІ	Nutilis Clear* загущувач	Liquigen жирова емульсія
Форма випуску	4x125 мл рідка суміш	4x125 мл рідка суміш	335 г суха суміш	4x200 мл рідка суміш	200 мл рідка суміш	175 г суха суміш	250 мл рідка суміш
Призначення	перорально	перорально	перорально	перорально	перорально	перорально	перорально
Харчова цінність, ккал	245	240	100	124	104	290	454
Білок, г	14,6	9,5	5	8,8	4,9	0,8	0
Джерело білка	93% казеїн 7% білків сироватки	90% казеїн 10% білків сироватки	64% соєвий білок 36% казеїн	80% казеїн 20% соєвий білок	51% ізолят соєвого білка 49% білків сироватки	-	-
Жири, г	9,6	10,4	3,3	3,55	3,8	0	50,4
Вуглеводи, г	25,1	25,4	12,3	14,5	11,5	57,6	0
Лактоза, г	<0,35	0,51	0,2	1,7	3,54	-	-
Харчові волокна, г	-	3,6**	0,6**	<0,5	2,5	28	0
Осмолярність, мОсмоль/л	570	790	330	500	365	-	42
Смаки	нейтральний, полуниця, ваніль, лісові ягоди	полуниця, ваніль	нейтральний, полуниця	полуниця	полуниця	нейтральний	нейтральний
Вік пацієнта	від 6-ти років	від 3-х років	від 18 років	від 3-х років	від 3-х років	від 3-х років	від народження

*на 100 г сухої суміші ** Включаючи пребіотики GOS/FOS

Рекомендований розрахунок субстратного забезпечення хворих			
Об'єм	Енергія, кг/доба	Білок, кг/доба	Примітки
Мінімальний	10-15 ккал	0,8-1 г	нестабільний стан хворого (мінімальне трофічне харчування)
Середній	15-25 ккал	1,2-1,5 г	стабільний стан з помірними явищами гіперметаболізму-гіперкатаболізму
Максимально доцільний	25-30 ккал	1,5-2 г	стабільний стан з вираженими явищами гіперметаболізму-гіперкатаболізму

Оцінка нутритивного статусу				
Ступені порушення харчування				
	Норма	Легка	Середня	Важка
ІМТ	>19	17-19	16-16,9	<16
Загальний білок	67-83	60-66	50-59	<50
Альбумін	>35	30-35	25-29	<25
Преальбумін	>160	140-160	110-140	<110
Лімфоцити	>1800	1800-1500	1500-900	<900

Інформація про склад продукту взята з етикетки продукту, представленого в Україні станом на листопад 2024. Інформація призначена виключно для медичних працівників. Інформація не призначена для передачі і використання особами, які не є медичними працівниками. Перед застосуванням продуктів, зазначених у цьому компендіумі, необхідно проконсультуватися з лікарем. ТОВ з іноземними інвестиціями "Нутриція Україна", Україна, 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14, корпус 2, тел. 0 800 50 17 85 (09:00-19:00, дзвінки зі стаціонарних телефонів по Україні безкоштовні). Детальніше на сайті: medical.nutricia.ua





ЗОНДОВЕ ХАРЧУВАННЯ



На 100 мл готової суміші	Nutrison Protein Intense	Nutrison Dison HP Energy низький ГІ	Nutrison Advanced Dison низький ГІ	Nutrison Advanced Cubison	Nutrison MultiFibre	Nutrison Energy	Nutrison
Форма випуску	500 мл рідка суміш	1000 мл рідка суміш	500 мл рідка суміш	1000 мл рідка суміш	1000 мл рідка суміш	1000 мл рідка суміш	1000 мл рідка суміш
Призначення	через зонд	перорально/через зонд	через зонд	через зонд	через зонд	через зонд	через зонд
Харчова цінність, ккал	126	150	103	104	103	150	100
Білок, г	10	7,69	4,3	5,5	4	6	4
Джерело білка	25% казеїн, 35% сироватковий, 20% соєвий білок 20% білків гороху	60% казеїн, 40% соєвий білок	100% соєвий білок	100% казеїн, в т.ч. L-аргінін 0,85	16% казеїн, 6% сироватковий, 46% соєвий білок 32% білків гороху	16% казеїн, 6% сироватковий, 46% соєвий білок 32% білків гороху	16% казеїн, 6% сироватковий, 46% соєвий білок 32% білків гороху
Жири, г	4,9	7,72	4,21	3,25	3,9	5,8	3,9
Вуглеводи, г	10,4	11,7	11,3	12,5	12,3	18,3	12,3
Лактоза, г	<0,025	<0,025	<0,006	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025
Харчові волокна*, г	0,09	1,5	1,5	1,5	1,5	<0,1	<0,1
DHA, мг	20,6	20	-	-	13,6	13,7	13,6
EPA, мг	30,1	29,9	-	-	20	20	20
Осмолярність, мОсмоль/л	275	395	300	315	250	360	255
Смаки	нейтральний	ваніль	нейтральний	нейтральний	нейтральний	нейтральний	нейтральний
Вік пацієнта	від 12 років	від 12 років	від 3-х років	від 3-х років	від 3-х років	від 3-х років	від 3-х років

*MF6

Рекомендований розрахунок субстратного забезпечення хворих

Етап*	Кількість, мл/доба	Енергія, ккал/кг/доба	Білок, г/кг/доба	Protein Intense		Dison HP Energy		Cubison		Nutrison	
				ккал/доба	г білка/доба	ккал/доба	г білка/доба	ккал/доба	г білка/доба	ккал/доба	г білка/доба
1 (1-2 доби)	500	10	0,8	640	50	750	38,45	520	27,3	500	20
2 (3-5 діб)	1000	15-25	0,8-1,2	1280	100	1500	76,9	1040	54,5	1000	40
3 (5+ діб)	1500	25-30	1,2-2	1920	150	2250	115,35	1560	81,8	1500	60

* У деяких пацієнтів, наприклад, у пацієнтів ВРІТ, пацієнтів з порушеннями травлення, тривалість кожного етапу з 1 по 3 може становити до 2 днів; при відсутності обмежень можливо більш швидке нарощування обсягу і швидкості введення.

Інформація про склад продукту взята з етикетки продукту, представленого в Україні станом на листопад 2024

ТОВ з іноземними інвестиціями "Нутриція Україна", Україна, 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14, корпус 2, тел. 0 800 50 17 85 (09:00-19:00, дзвінки зі стаціонарних телефонів по Україні безкоштовні). Детальніше на сайті: medical.nutricia.ua

