

СТУПІНЬ РОЗЩЕПЛЕННЯ БІЛКА
ТА ВМІСТ ЛАКТОЗИ

Лактоза, г / 100 мл

0,0

<0,1

2,7

4,3

7,3



Вільні
амінокислоти

Цільний
білок

Глибокий
гідролізат

Частковий
гідролізат

Цільний
білок

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

СПЕЦІАЛЬНОГО ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ ПРИ ПРОБЛЕМАХ З ТРАВЛЕННЯМ

ХАРЧОВА/ ПОЖИВНА ЦІННІСТЬ на 100 мл готового продукту	Nutrilon Комфорт 1	Nutrilon Кисло- молочний 1	Nutrilon Анти- рефлюкс	Nutrilon Безлак- тозний	Liquigen	Nutrilon Мальаб- сорбція	Infatrini Пептісорб	Neocate Infant	Neocate Junior	Nutrison Powder	Fortini Powder	Fortini Multi Fibre	Nutrini
Вуглеводи, г	7	8,3	7,4	7,3		7,2	10,2	7,1	11,8	12,2	18,7	18,8	12,5
Лактоза, г	2,7	4,3	7,3	<0,006		0,05	<0,10			<0,030	<0,03	<0,025	<0,025
Пребіотики та харчові волокна, г	0,8 GOS/FOS 9:1											1,5 mf6	
Загущувач, г	1,4 амілопектин		0,4 камедь										
Білки / *еквівалент, г	1,5	1,4	1,3	1,3		1,8	2,6	1,8*	2,8*	3,9	3,4	3,4	2,5
Казеїн / сироватковий білок	0:100	50:50	60:40	100:0		0:100	0:100	вільні аміно- кислоти	вільні аміно- кислоти	100:0	100:0	100:0	40:60
Гідролізат	частковий	частковий				глибокий	глибокий						
Жири, г	3,4	3,2	3,4	3,5	50,4	3,4	5,4	3,5	4,6	3,9	6,9	6,8	4,4
Пальмітинова кислота, мг	610	554	610	598	330	273	469	256		664	1315	349	260
β-пальмітат, % ¹	41	12	1	11		9	1	6		11		10	11
Ейкозопентаєнова кислота, мг	3,6	1,3	3,6	1,4		3,6	7,13	2,91					8,41
Докозагексаєнова кислота, мг	16,5	6,1	16,5	6,7		16,6	25	16,7					35,7
Арахідонова кислота, мг	16,5	6,1	16,5	12		16,6	25,2	17					2,51
Середньоланцюгові тригліцериди	г				49,1	1,7	2,8	0,66	1,60				
	% ²				97	50	52	19	35				
D ₃ – колекальциферол	мкг	1,7	1,2	1,6	1,2	1,7	2,4	1,59	1,3	1,3	1,7	1,5	1
	МО	68	48	64	48	68	96	64	52	52	68	60	40
Залізо, мг	0,73	0,7	0,79	0,79		0,72	1,2	1	1,2	1,59	1,5	1,5	1
Цинк, мг	0,48	0,6	0,63	0,56		0,67	0,8	0,73	1,1	1,2	1,5	1,5	1
Рівень pH	6,8	5,7-6,1											
Калорійність, ккал	66	68	66	66	454	66	100	67	100	100	150	153	100
Осмолярність, мосмоль/л	220	220	270	150	42	200	295	310	520	320	425	380	200

1Вміст β-пальмітату може незначно коливатися через використання натуральної сировини (у всіх продуктах, окрім Nutrilon Комфорт 1 та 2). 2% від усіх жирів.
Безумовна перевага надається грудному вигодовуванню. Матеріал призначений для медичних працівників. Дані з реєстраційних документів станом на 1 вересня 2025 року.
Юридична адреса ТОВ з іноземними інвестиціями «Нутриція Україна»: Україна, 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14, корп. 2.

NUTRICIA

ПРИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ
РОЗЛАДАХ ТРАВЛЕННЯ



* на 100 мл готової суміші. Безумовна перевага надається грудному вигодовуванню. Матеріал призначений для медичних працівників.

від народження

від 1 року

1-6 років
8-20 кг



Кольки/здуття	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Функціональні запори	✓										✓	
Функціональні зригування	✓		✓									
ГЕР/ГЕРХ			✓			✓	✓	✓	✓			
Діарея	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Лактазна недостатність	✓*	✓*		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ферментна недостатність підшлункової залози					✓	✓	✓	✓				
Синдром мальабсорбції					✓	✓	✓	✓				
Синдром короткої кишки					✓	✓	✓	✓				
Еозинофільний езофагіт							✓	✓				
Гастроінтестинальна форма алергії					✓	✓	✓	✓				
Запальні захворювання кишечника (в т.ч. хвороба Крона, виразковий коліт)									✓	✓		✓

ВИБІР СУМІШІ ПРИ КОЛЬКАХ

Nutrilon КОМФОРТ



При симптомах будь-якої тяжкості

Потужніша дія
2,7 г лактози, 0,8 г пребіотиків, частковий гідролізат



Nutrilon КИСЛОМОЛОЧНИЙ



При легких симптомах у дітей, вибагливих до смаку

Приємніший смак
4,3 г лактози, ферментований білок, нейтральний pH



ШКАЛА ІНТЕНСИВНОСТІ ЗРИГУВАНЬ



Nutrilon КОМФОРТ 1-2 бали

амілопектин
1,4 г / 100 мл



Nutrilon АНТИРЕФЛЮКС 1-5 балів

камедь бобів річкового дерева 0,4 г / 100 мл

0	1	2	3	4	5
відсутність зригувань	<5 зригувань на добу, б'ємом <2-3 мл	>5 зригувань на добу, разовий об'ємом >3 мл	постійні зригування невеликого об'єму протягом 30 хв після кожного годування	зригування від половини до повного об'єму суміші у половині годувань	зригування від половини до повного об'єму суміші після кожного годування

Безумовна перевага надається грудному вигодовуванню. Матеріал призначений для медичних працівників.

Комплекс пребіотиків GOS/FOS 9:1 в ефективній дозі 0,8 г / 100 мл сприяє нормалізації консистенції та частоти випорожнень¹




GOS FOS
суміш із ~100 структур харчових волокон: галактоолігосахариди (синтезовані з лактози), фруктоолігосахариди (з кореню цикорія)

ЕФЕКТИВНА ДОЗА GOS/FOS 9:1

- м'які випорожнення
- нормалізація частоти випорожнень
- підтримка здорової мікробіоти кишечника

Комбінація харчових волокон mfb нормалізує частоту випорожнень та скорочує тривалість діареї



mfb
суміш із 6 волокон: інулін, олігофруктоза, резистентний крохмаль, полісахариди із сої, гуміарабік, целюлоза

ЕФЕКТИВНА ДОЗА MFB

- скорочує тривалість діареї та запорів^{2,4}
- пом'якшує консистенцію випорожнень³

¹ Moro G. Dosage-related bifidogenic effects of galacto- and fructooligosaccharides in formula-fed term infants / G. Moro, I. Minoli, M. Mosca, [et al.] // Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. – 2002. – №3 (34). – P. 291-295. ² Trier E. Effects of a multifibre supplemented paediatric enteral feed on gastrointestinal function / E. Trier, J.C.K. Wells, A.G. Thomas // Journal of Pediatric Gastroenterology & Nutrition. – 1999. – Vol. 28 (5). – 595 p. ³ Grogan J. Gastroin testinal effects of two fibre enriched paediatric enteral tube feeds / J. Grogan [et al.] // Journal of Human Nutrition and Dietetics. – 2006. – Vol. 19. – P. 458-477. ⁴ Wierdsma N.J. Comparison of two tube feeding formulas enriched with guar gum or mixed dietary fibres / N.J. Wierdsma, H.M. Kruijsen, A. Droop [et al.] // Nederlands Tijdschrift voor Diëtetiek. – 2001. – Vol. 56. – P. 243-247. Безумовна перевага надається грудному вигодовуванню. Матеріал призначений для медичних працівників.

*при частковій лактазній недостатності. Безумовна перевага надається грудному вигодовуванню. Матеріал призначений для медичних працівників.