



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ХАРЧУВАННЯ
ПРИ ПІДВИЩЕНИХ НУТРИТИВНИХ ПОТРЕБАХ

ХАРЧОВА/
ПОЖИВНА ЦІННІСТЬ
на 100 мл готового продукту

		Infatrini	Infatrini Penticoorb	Fortini Multi Fibre з нейтральним смаком*	Fortini Powder з нейтральним смаком*	Nutrison Powder**	Nutrini	Nutridrink Compact Fibre*	Liquigen Жирова емульсія
									
		0-18 місяців або до 9 кг	0-18 місяців або до 9 кг	від 1 року	від 1 року	від 1 року	1-6 років або 8-20 кг	від 3 років	від народження
Білки, г		2,6	2,6	3,4	3,4	3,9	2,5	9,5	0
Сироватковий білок / казеїн		60:40	100:0	0:100	0:100	0:100	60:40	3:97	
Ступінь розщеплення білка		цільний	глибокий гідролізат	цільний	цільний	цільний	цільний	цільний	
Жири, г		5,4	5,4	6,8	6,9	3,9	4,4	10,4	50,4
Ейкозапентаєнова кислота, мг		5,8	7,13				8,41		
Докозагексаєнова кислота, мг		25,3	25				35,7		
Середньоланцюгові тригліцериди, г		1,5	2,8						49,1
Лактоза, г		5,33	<0,10	<0,025	<0,03	<0,030	<0,025	0,51	
Препіотики та харчові волокна, г		0,8 GOS/FOS 9:1 0,02 2-FL		1,5 mf6				3,6 mfC	
Ca – кальцій, мг		101	90	84	84	80,1	60	165	1
Mg – магній, мг		9,14	9	17	16	15	11	32,4	
Fe – залізо, мг		1,2	1,2	1,5	1,5	1,59	1	3,86	
Zn – цинк, мг		0,8	0,8	1,5	1,5	1,2	1	2,8	
I – йод, мкг		19	19	15	15	13,6	10	37,4	
D ₃ – колекальциферол	мкг	2,4	2,4	1,5	1,7	1,3	1	1,8	
	МО	96	96	60	68	52	40	72	
B ₉ – фолієва кислота, мкг		16	16	23	27	26,6	15	61,3	
B ₁₂ – ціанкобаламін, мкг		0,3	0,3	0,26	0,26	0,22	0,25	0,7	
C – аскорбінова кислота, мг		14	14	15	18	12,9	10	24	
Калорійність, ккал		100	100	153	150	100	100	240	454
Осмолярність, мосмоль/л		305	295	380	425	320	200	790	42

* Значення показників можуть незначно відрізнятися за смаками.
** Суміш має два варіанти розведення (ізо- та гіперкалорійне), у таблиці наведено дані відповідно до ізокалорійного. Дані за реєстраційних документів станом на 1 вересня 2025 року.
ВООЗ рекомендує зберігати грудне вигодовування до 2 років, Nutricia безумовно підтримує дану рекомендацію. Матеріал призначений для медичних працівників.
Юридична адреса ТОВ з іноземними інвестиціями «Нутриція Україна»: Україна, 04080, м. Київ, вул. Віктентія Хвойки, 18/14, корп. 2.



ПРИ ПІДВИЩЕНИХ НУТРИТИВНИХ ПОТРЕБАХ
ВІД НАРОДЖЕННЯ



НА ПОВНИЙ РАЦІОН АБО ЯК ДОПОВНЕННЯ

ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 18 МІСЯЦІВ АБО 9 КГ



Infatrini
125 мл



Infatrini Пептікорб
200 мл



ЖИРОВА ЕМУЛЬСІЯ

ВІД НАРОДЖЕННЯ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ



Liquigen
250 мл



Підвищений вміст
калорій та білків



Знижений
вміст лактози 5,33 г*



Підвищений вміст
калорій та білків



Низький
вміст лактози <0,10 г*



Підвищений вміст
калорій



Препіотики
GOS/FOS 9:1, 2-FL



Середньоланцюгові
тригліцериди



Глибокий
гідролізат білка



Середньоланцюгові
тригліцериди



Середньоланцюгові
тригліцериди та вода

* на 100 мл готової суміші
ВООЗ рекомендує зберігати грудне вигодовування до 2 років, Nutricia безумовно підтримує дану рекомендацію.
Матеріал призначений для медичних працівників.



НА ПОВНИЙ РАЦІОН АБО ЯК ДОПОВНЕННЯ

від 1 року без обмежень

від 1 до 6 років
або 8-20 кг

від 3 років
без обмежень



Fortini Multi Fibre
200 мл



Fortini Powder
400 г



Nutrison Powder
430 г



Nutrini
500 мл



Nutridrink Compact Fibre
125 мл



Підвищений вміст калорій та білка



Низький вміст лактози <0,025 г*



Харчові волокна mfb



Підвищений вміст калорій та білка



Низький вміст лактози <0,03 г*



Не містить харчових волокон



Підвищений вміст калорій та білка



Низький вміст лактози <0,030 г*



Можна додавати до інших страв



Підвищений вміст калорій та білка



Низький вміст лактози <0,025 г*



Зручний вибір для зондового харчування



Підвищений вміст калорій та білка



Низький вміст лактози 0,51 г*



Харчові волокна mfc

* на 100 мл готової суміші

ВООЗ рекомендує зберігати грудне вигодовування до 2 років, Nutricia безумовно підтримує дану рекомендацію. Матеріал призначений для медичних працівників.

ПОШИРЕНІСТЬ МАЛЬНУТРИЦІЇ¹



1 із 5 дітей, які потрапляють до лікарень



1 із 4 дорослих пацієнтів у лікарні



1 із 3 хворих на рак



1 із 3 пацієнтів у спеціалізованих закладах



1 із 3 людей похилого віку, які проживають самі

НАСЛІДКИ МАЛЬНУТРИЦІЇ



Зниження темпів росту та розвитку у дітей



Підвищення частоти ускладнень і ризиків виникнення інфекцій



Збільшення тривалості госпіталізації



Підвищення ризиків слабкості, зниження рухливості та незалежності у людей похилого віку



Підвищення рівня смертності



Обстежуйте стан пацієнтів для виявлення мальнутриції



Забезпечуйте своєчасну нутритивну підтримку відповідно до клінічних рекомендацій



Стежте за новинками спеціалізованого харчування



Залучайте дієтологів, нутриціологів та зацікавлених лікарів до консилиумів



Пояснюйте пацієнтам проблему мальнутриції



✓ діагностика мальнутриції
✓ розрахунок добових потреб



✓ особливості призначення клінічного харчування



✓ методичні рекомендації з ведення мальнутриції

¹ Malnutrition - A condition that affects 33 million people in Europe [Електронний ресурс] // Medical Nutrition International Industry. - Режим доступу: https://www.medicalnutritionindustry.com/files/user_upload/infographics/MNI_Infographic_malnutrition.pdf

ВООЗ рекомендує зберігати грудне вигодовування до 2 років, Nutricia безумовно підтримує дану рекомендацію. Матеріал призначений для медичних працівників.