

ПОШИРЕНІ ПОМИЛКИ
ПРИЗНАЧЕНЬ ПРИ ХАРЧОВІЙ АЛЕРГІЇ¹



БЕЗЛАКТОЗНА СУМІШ
цільний білок



СУМІШ З КОЗЯЧОГО МОЛОКА
високий ризик
перехресної реакції



СОЄВА СУМІШ
не рекомендована
дітям до 6 місяців



ЧАСТКОВИЙ ГІДРОЛІЗАТ
недостатньо
ефективний

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
СПЕЦІАЛЬНОГО ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ ПРИ АЛЕРГІЇ НА БКМ

Харчова/ поживна цінність на 100 мл готового продукту		 Nutrilon Пепті	 Infatrini Пептісорб	 Nutrilon Мальабсорбція	 Neocate Infant	 Neocate Junior
Білки, г		1,6	2,6	1,8	1,8*	2,8*
Фракція білка (казеїн / сироватка)		0:100	0:100	0:100		
Ступінь розщеплення білка		глибокий гідролізат	глибокий гідролізат	глибокий гідролізат	вільні амінокислоти	вільні амінокислоти
Омега-3	Вільні амінокислоти, %**	13	21	14	100	100
	α-ліноленова кислота, мг	54,3	66,4	53,8	44,5	76
	Докозагексаєнова кислота, мг	16,5	25	16,6	16,7	
Омега-6	Ейкозапентаєнова кислота, мг	3,6	7,13	3,6	2,91	
	Середньоланцюгові тригліцериди, г		2,8	1,7	0,66	1,60
Лактоза, г		2,9	<0,10	0,05		
Пребіотики GOS/FOS 9:1, г		0,8				
Кальцій, мг		61	90	76	78,3	90,3
Залізо, мг		0,54	1,2	0,72	1	1,2
Цинк, мг		0,66	0,8	0,67	0,73	1,1
Селен, мкг		3	3,75	2,9	2,53	3,2
Йод, мкг		13	19	13	14	15
С – аскорбінова кислота, мг		9,1	14	9,3	7,11	10
D ₃ – колекальциферол	мкг	1,7	2,4	1,7	1,59	1,3
	МО	68	96	68	64	52
Енергетична цінність, кДж (ккал)		276 (66)	418 (100)	276 (66)	279 (67)	420 (100)
Осмолярність, мосмоль/л		250	295	200	310	520

¹Білковий еквівалент. ^{**}Вміст вільних амінокислот може незначно коливатися через особливості технології гідроліза натуральної сировини (у всіх сумішах, окрім Neocate, де використано вільні амінокислоти немолочного походження). Безумовна перевага надається грудному вигодовуванню. Матеріал призначений для медичних працівників. Дані з реєстраційних документів станом на 1 вересня 2025 року. Юридична адреса ТОВ з іноземними інвестиціями «Нутриція Україна»: Україна, 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14, корп. 2.



ПРИ ХАРЧОВІЙ АЛЕРГІЇ
РІЗНИХ ФОРМ ТЯЖКОСТІ



ГЛИБОКИЙ ГІДРОЛІЗАТ
при алергії легкої та середньої тяжкості



АМІНОКИСЛОТИ
при алергії будь-якої тяжкості

мальдігестія, мальабсорбція

мальдігестія,
мальабсорбція

недобір ваги



NUTRILON ПЕПТІ
від народження



Пребіотики
GOS/FOS 9:1



Знижений вміст
лактози, 2,9 г**



Нейтральний смак
завдяки лактозі



INFATRINI ПЕПТІСОРБ
від 0 до 18 місяців або 9 кг



Середньоланцюгові
тригліцериди, 52%*



Низький вміст
лактози, <0,10 г**



Висока харчова
та енергетична
цінність



NUTRILON МАЛЬАБСОРБЦІЯ
від народження



Середньоланцюгові
тригліцериди, 50%*



Низький вміст
лактози, 0,05 г**



Знижена
осмолярність



NEOCATE INFANT
від народження



Середньоланцюгові
тригліцериди, 19%*



Не містить
лактози



Нейтральний смак
без гірких
гідролізатів



NEOCATE JUNIOR
від 1 року



Середньоланцюгові
тригліцериди, 35%*



Не містить
лактози



Нейтральний смак
без гірких
гідролізатів

*% від загального вмісту жирів. **на 100 мл готової суміші. Безумовна перевага надається грудному вигодовуванню. Матеріал призначений для медичних працівників.

Анамнез, клінічний огляд, лабораторні тести

Реакція?

Сповільненого типу

Негайного типу

Елімінаційна дієта на 2-4 тижні

Елімінаційна дієта

HI

Полегшення симптомів?

ТАК

—

Специфічний IgE?

+

Стандартна оральна провокаційна проба з БКМ

—

+

Елімінація БКМ не потрібна, базова суміш

Повне виключення БКМ min 6 місяців


Алергенність

Амінокислоти

Глибокий гідролізат

Частковий гідролізат

Цільний білок



Протягом 3 днів
полегшення шкірних
та гастроінтестинальних
проявів алергії²

Протягом 14 днів
усунення всіх симптомів
з боку шлунково-кишкового
тракту³

¹ Особливості діагностики та підходи до лікувально-профілактичного харчування дітей раннього віку з алергією до білка коров'ячого молока : метод. рекоменд. / [О. Г. Шадрін, С. Л. Няньковський, Г. В. Бекетова та ін.]. – К. : Люди в білому, 2014. – 28 с.
Безумовна перевага надається грудному вигодовуванню. Матеріал призначений для медичних працівників.

² De Boissieu D. Allergy to extensively hydrolyzed cow milk proteins in infants: identification and treatment with an amino acid-based formula / Delphine de Boissieu, Pellegrino Matarazzo, Christophe Dupont // The Journal of Pediatrics. – 1997. – №131 (5). – P. 744-747. ³ Intolerance to protein hydrolysate infant formulas: an underrecognized cause of gastrointestinal symptoms in infants / Jon A. Vanderhoof, Nancy D. Murray, Stuart S. Kaufman [et al.] // The Journal of Pediatrics. – 1997. – №131 (5). – P. 741-744. Безумовна перевага надається грудному вигодовуванню. Матеріал призначений для медичних працівників.